

HASTA BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMU

SEPTORİNOPLASTİ – RİNOPLASTİ (BURUN ESTETİK) AMELİYATI

PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK
MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. AKGÜL APT.
1/11 ÇUKURAMBAR-ANKARA

HASTA ADI-SOYADI:.....
YAŞI- CİNSİYETİ:.....
BİLGİLENDİRME TARİHİ:.....
ADRES:.....
.....

YAPILACAK İŞLEM

Bu form sizi burun ameliyatının riskleri, süreci ve sonuçları hakkında bilgilendirecektir, alternatif tedaviler hakkında aydınlatacaktır. Lütfen dikkatlice okuyunuz, her sayfayı imzalayınız, sorularınız veya anlamadığınız noktalar varsa doktorunuza sorunuz.

Size **Rinoplasti / Septorinoplasti** ameliyatı yapılacaktır. Bu ameliyat burnun dış görünüşünü veya hem dış görünüşünü, hem de septumunu (burun orta direği) düzeltmeye yönelik bir girişimdir. Anestezi sonrası burun içine ve gerekirse dışına kesiler yapılacak, burundaki fazla kıkırdaklar alınacak, burun sırtındaki kamburluk alınacak, gerekirse burun kemikleri kesilecek, burun orta direği eğri ise düzeltilecek, aşırı bozuk kısımları çıkarılacak, buruna gerekli dokular yerleştirilecek (greft) ve kesiler dikilerek ameliyat tampon (gerekirse), bandaj ve alçı atel konularak bitirilecektir.

ALTERNATİF TEDAVİLER

Burun ameliyatı olmazsanız yaşamınızla ilgili bir risk oluşmaz. Ancak nefes alma güçlükleri ağız kuruluğu, sinüzit ve burun akıntılarına yol açabilir. Burun ameliyatının oluşturacağı şekil ve nefes alma değişikliklerini sağlayabilecek alternatif bir tedavi bulunmamaktadır. Burun eti (konka) şişmişse ve bu nedenle ameliyat olunuyorsa bu ilaçla tedavi edilebilir.

ANESTEZİ (NARKOZ)

Size **Genel** ve/veya **Lokal** anestezi verilecektir. Anestezi, sizin ameliyat süresince uyku halinde ve ağrısız bir dönem geçirmenizi sağlar. Günümüzde modern anestezi oldukça güvenli olmakla birlikte yine de bazı riskler taşımaktadır. Bununla birlikte bu riskler, bir trafik kazası olasılığından daha düşüktür.

Anestezinin Sık Görülen Yan Etkileri:

- Bulantı, kusma
- Baş ağrısı
- Enjeksiyon alanlarında ağrı, şişlik, morarma
- Boğazda ve dudaklarda kuruluk / yanma
- Bulanık ya da çift görme
- Kas ağrıları
- Halsizlik
- Kaşıntı, döküntü tarzında alerjik reaksiyonlar
- **Anestezinin Nadir Görülen Yan Etkileri:**
- Anestezi sırasında uyanık duruma gelme
- Dişlerde kırık/kayıp
- Dudaklarda yaralar
- Ses tellerinde hasar; geçici/kalıcı ses kaybı

Hasta imzası

- Alerjik reaksiyon ve/veya astım
- Bacaklarda kan pıhtılaşması
- Basıya maruz kalan yerlerde sinir hasarı
- Nöbet geçirme (epilepsi/sara)
- **Anestezinin Ölümüne Neden Olabilen Nadir Riskleri:**
- Alerji / Şok
- Çok yüksek ateş
- Felç (inme) inmesi ya da kalp krizi
- Mide içeriğinin akciğerlere kaçması
- Paralizi (bacaklarda motor kayıp)
- Bacaklarda kan pıhtılaşması
- Beyin hasarı
- **Risklerin Arttığı Durumlar:**
- Nezle/Grip ya da astım gibi solunum yolu hastalıkları
- Sigara kullanımı
- İdeal kilonun üzerinde olma
- Şeker hastalığı
- Kalp hastalıkları
- Böbrek hastalıkları
- Yüksek tansiyon
- Diğer ciddi rahatsızlıklar

GENEL RİSKLER

- Akciğerlerinizde küçük alanlarda kapanma görülebilir. Bu durum, akciğer enfeksiyonu riskini artırır. Antibiyotik kullanımı ve solunum fizyoterapisi gerekebilir.
- Bacaklarda kan pıhtılaşması sonucu şişme ve ağrı olabilir. Bu pıhtılar nadiren bulunduğu yerden ayrılıp kan dolaşımıyla akciğerlerinize gidip ölüme varan sonuçlara neden olabilir.
- İşlem sırasında kalp krizi/felç görülebilir
- İşlem sırasında ölüm görülebilir.
- Şişman hastalarda ve/veya sigara içenlerde yara yeri ve solunum yolları enfeksiyonları, kalp ve akciğer sorunları ve damar içi pıhtılaşma görülebilir.

YÖNTEME AİT RİSKLER

- **Kanama:** Burun fazla kan damarı içerir. Ameliyat sırasında ve ameliyattan birkaç hafta sonrasına kadar kanama görülebilir. Ameliyatta kanamanın az olması için damarları daraltan madde içeren lokal anestezi ilaç yapılmaktadır.
- **Morarma-şişme:** Burun ameliyatı sonrasında burun ve çevresinde şişme (ödem) olur. Bu günler içinde azalarak yaklaşık 6-8 haftada tam olarak dağılır. Burun ve göz çevresinde morarmalar normaldir. Morarma 10-15 gün içinde dağılır. Göz içinde kanama ve kızarıklık olursa bu da aynı sürelerde dağılır.
- **Enfeksiyon:** Burunda ameliyat sonrası enfeksiyon riski çok küçüktür. Fakat yine de antibiyotik kullanımı gerekebilir.
- **Görüntü:** Başvuru anındaki burun probleminin ameliyattan sonra da devam etmesi ya da yeniden ortaya çıkması görülebilir. İyileşme sürecinde kemikler veya kırıkdağlar dönebilir, yanlış kaynayabilir. Bunun sonunda burnun dış görünüşü tatmin edici olmayabilir.

- **Revizyon:**Rinoplasti ameliyatı %10-20 olguda, revizyon cerrahisi gerektirecek şekilde nefes ve görüntü problemi yaratabilir. Hastanın tekrar ameliyatı gerekebilir.
- **Yara izi:** Klasik kapalı rinoplastide (burun ameliyatı) burundaki izlerin çoğu burun delikleri içinde kalacaktır. Bazen kemik kesilirken dışarıdan müdahale gerekebilir. Bu burun sırtında iz yapabilir. Açık teknikle ameliyat yapıldığında veya geniş burun kanatları küçültüldüğünde burun dışında kalıcı izler olacaktır.
- **Sizde açık burun ameliyatı yapılacaktır.** İzlerde anormal yara iyileşmesi sonucunda belirgin nedbe dokusu (yara izi) oluşabilir (özellikle açık ameliyat tekniğinde). Genelde bu izler hastalarda fazla problem yaratmamaktadır. Fakat izlerin hayat boyu kalacağı kesindir. (Bu seçenek yoksa çiziniz)
- **Duyu:** Ameliyat sonrası burun tamamında veya ucunda duyu bozuklukları, hissislik, aşırı üşüme veya farklı duyular (burun akma hissi gibi) olabilir.Koku ve tat almada bozukluk ya da kayıplar olabilir. Dudağın üst kısmında ve ön dişlerde uyuşukluk görülebilir. Bu duyu bozuklukları genellikle 3-8 ay içine düzelmektedir. Fakat yaşam boyu kalıcı da olabilir.
- **Yapışıklık:** Revizyon cerrahisi gerektirecek şekilde burun içinde yapışıklıklar olabilir
- **Burun çevresi:** Beyin-omurilik sıvısı kaçağı; göz çevresinde şişme ve morarma, göz altında abse ve kanama görülebilir.
- **Horlama:** Burun ameliyatı horlamayı tedavi etmez. Nefes düzelince horlama geçebilir. Ayrıca burun ameliyatı sonrası değişen anatomik ve fizyolojik durum nedeniyle horlama ve uyku bozuklukları görülebilir.
- **Septum delinmesi:** Revizyon cerrahisi gerektirecek şekilde burnun orta direğinde (septum) delinme görülebilir.
- **Diğer alanlarda izler:** Burun ameliyatında (özellikle çökmüş burunlarda) kulaktan veya kaburgalardan kıkırdak ve/veya kemik almak gerekebilir. Bu durumda yerine göre kulakta veya kaburgalar üzerinde alınan parçanın (greftin) büyüklüğüne göre kalıcı izler olacaktır.

HASTANIN RIZASI

Doktorum PROF.DR. SERDAR ÖZTÜRK bana mevcut durumum ve yapmayı planladığı cerrahi girişim hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi. Doktorumla alternatif tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarını ayrıntılı olarak tartıştım. Bu ameliyatın genel ve bana özel olan tüm risklerini anlıyor ve kabul ediyorum.

Burnumun içine tampon, üzerine alçı konacağını, daha sonraki haftalarda bandajlar olabileceğini biliyorum.

Burnumun içinde ve / veya dışında ameliyata bağlı izler olacağını anladım. Ameliyat gereği burnumdan kemik, kıkırdak ve yumuşak doku alınacağını bunların bir kısmının burnun düzeltilmesinde kullanılacağını, bir kısmının da yok edileceğini biliyorum. Burun deliklerimin daraltılmasına bağlı deliklerin yan taraflarında izler kalabileceğini ve bu işlem sonrası deliklerin büyüklüklerinde tam simetrisinin sağlanamayacağını biliyorum.

Burnumda kullanılmak üzere kulağımdan ve gerekirse kaburgalarımın deri, kemik ve kıkırdak parçalar alınmasını kabul ediyorum. Bu durumda bu bölgelerde iz kalacağını biliyorum. (Bu maddeyi istemiyorsanız üstünü çiziniz)

Serum ve gerektiği takdirde bana kan verilmesini kabul ediyorum.

Ameliyat sırasında hayatı tehdit edici bir durum ortaya çıkması halinde o an gerekli görülen tedavinin uygulanmasını kabul ediyorum.

Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında gerekli tıbbi resim ve videolarımın çekilmesine

izin veriyorum.Bu resim ve videoların tıbbi ve bilimsel amaçlarla başka doktorlara gösterilebileceğini biliyorum.

□ Bu resim ve videoların bilgi vermek amacıyla diğer hastalara gösterilmesine izin veriyorum (İsterseniz onaylayınız, yoksa üzerini çiziniz)

Genel anestezi ile ilgili risklerin de olduğunu, bunların anestezi uzmanı sorumluluğunda olduğunu ve bunlar için ayrıca açıklama yapılacağını ve form imzalatılacağını biliyorum.

Sonuç olarak bu ameliyatın sonucu hakkında bana garanti verilmediğini, beklenen sonucun çeşitli nedenlerle elde edilememesi olasılığının olduğunu, hatta şu anki durumdan daha kötü sonuçlar elde edilebileceğini anladım.

Burun ameliyatının burnumda ve yüzümde kalıcı şekil değişikliğine, yüzümde sabit esere (yara izine) yol açacağını biliyor ve kabul ediyorum.

Bunların sonunda bana doktorum PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK ve kendisinin belirlediği uzman ve asistan ekibin bana detaylı anlatılan.septorinoplasti- rinoplasti (estetik burun) ameliyatı uygulamasını kendi rızamla ve hiçbir etki altında kalmadan kabul ediyorum.

HASTA

ADI SOYADI:

İmza:

**Hastanın yasal temsilcisi Adı-soyadı
Yakınlığı**

İmza

TANIK: Hasta uyanık ve bilinçli olarak anlatılanları ve okuduklarını kabul etmiş ve formu önümde imzalamıştır.

ADI SOYADI:

İmza:

**Hastanın yasal temsilcisi Adı-soyadı
Yakınlığı**

İmza

DOKTORUN BEYANI:

- Hastanın durumunu,
- Tedavi için ihtiyaçlarını,
- Ameliyatın işlemini ve risklerini,
- İlişkili tedavi seçeneklerini ve bunların risklerini,
- Eğer risk gerçekleşirse olası sonuçlarını,
- Hastaya göre değişen özel önemli riskleri ve sonuçları açıkladım.
- Yukarıdaki konular hakkında sorular sorması, her türlü endişesinin giderilmesi için hastaya / yerine karar verecek kişiye fırsat tanıdım;

Ben hastanın ve yakınlarının verilen bilgileri anladığımı düşünüyorum.

Doktor: Prof.Dr. Serdar ÖZTÜRK

Tarih. İmza

Hasta imzası: